

大血藤属一新种

曲式曾 闵成林

A NEW SPECIES OF SARGENTODOXA FROM SHAANXI

Qu Shi-zeng Min Cheng-lin

单叶血藤 新种 图

Sargentodoxa simplicifolia S. Z. Qu et C. L. Min, sp. nov.

S. cuneatae Rehd. et Wils. affinis, sed manifeste differt foliis simplicibus et andromonoeciis.

Liana lignosa ad 25 m alta, 9 cm diam., cortex subereus, profunde longitudinaliter fissus, griseo-brunnea. Planta omnino glabra. Gemmae pluriperulatae, perulis scariosis; ramuli teretea annotini fusci, longitudinaliter sexfissi. Folia simpli cia decidua, ovato-reniformia vel cordiformia, 7—14 cm longa et 8—18 cm lata, apice rotundata vel interdum abrupte acuta, rarius 2—3 serrato-lobulata, margine integra, basi saepe cordata, rarius truncata, quinque-septemnervia; petioli 5—15 cm longi. Flores andromonoeci, inflorescentia axillaris, in racemis multifloribus pendulis 5—25 cm longis disposita pedicelli 1.5—5.5 cm longi, basi bractea ovata acuminata 5—6 mm longa suffulti, supra basin bracteolis 2—3(4) minutis subulatis distantibus ins-

曲式曾, 陕西, 杨陵, 西北林学院, (North-Western College of Forestry, Yangling, Shaanxi).

闵成林, 陕西, 宁陕县, 宁西林业局(Ningxi Forestry Bureau, Ningshan, Shaanxi).

承宁西林业局刘毅先生热情帮助, 张运战同志协助采集标本, 特表谢意!

tructi, sepala 6, in floribus hermaphroditis rarius ad 7—8, flavovirentia, anguste oblonga vel ovato-oblonga, 8—13 mm longa et 3—6 mm lata, obtusa, margine membranacea, petala 6, in floribus hermaphroditis rarius ad 2—3, nectariformia glauca, 1.5 mm longa; flores masculi, stamina 6, libera, 4 mm longa, extrosa connectivis late apiculatis, filamentis 2 mm longis; pistillo rudimentario minuto nunc 1—45 nunc nullo; flores hermaphroditi, stamina 6(—9), 1.5—4 mm longa, filamentis dilatatis; carpella discreta, 48—90, spiralia, toro conico insidentia, ovulum solitarium in quoque carpello. Syncarpia pauca in quoque racemo evoluta, carpella baccata, 7 mm longa, stipitibus 13 mm longis insidentia; semina ellipsoidea, 6 mm longa et 5 mm lata, testa nitida nigra.

Shaanxi, Ningshan county, alt. 1390m. Min Cheng-lin 1421, same locality, alt. 1300m, 12 Oct. 1984, Min Cheng-lin 1703, branch of fruits; same locality, alt. 1530m, 12 May 1985, Min Cheng-lin 1888, flowering branch (Type in Herb. North-Western College of Forestry); same locality, 10 May 1986, Min Cheng-lin 1891, flowering branch.

落叶木质藤本，长达25米，粗约9厘米；树皮木栓质发达，深纵裂，灰褐色；全体无毛。冬芽被多数鳞片；小枝褐色，圆筒形，具6条纵沟纹。单叶，卵状肾形或宽心形，长7—14厘米，宽8—18厘米，先端钝圆，5—7或有时突尖，稀具2—3锯齿状浅裂，全缘，基部常心形，稀近截形，具主脉；叶柄长5—15厘米。雄花与两性花同株，总状花序，腋生，具多花，下垂，长5—25厘米；花梗长1.5—5.5厘米，基部具苞片，卵形，端渐尖，长5—6毫米，基部以上具小苞片2—3(—4)，凿形，散生；萼片6，在两性花中偶7—8，黄绿色，长圆形至卵状长圆形，长8—13毫米，宽3—6毫米，先端钝，边缘膜质；花瓣6，在两性花中偶2—3，蜜腺状，长约1.5毫米；雄花：雄蕊6，离生，长约4毫米，花药外向，药隔宽扁，顶端具尖头，花丝长约2毫米，退化雌蕊小，1—45枚或无；两性花：雄蕊6(—9)，长1.5—4毫米，花丝宽扁，花托圆锥形，心皮48—90，离生，螺旋状着生，每心皮具1胚珠。聚合浆果，小浆果近球形，长约7毫米，具柄，柄长13毫米；种子椭圆形，长约6毫米，黑色具光泽。

新种与大血藤 *S. cuneata* Rehd. et Wils. 相近，明显不同处在于

叶为单叶及花为雄花与两性花同株。

陕西：宁陕县，海拔1390米，闵成林1421，同地，海拔1300米，1984年10月12日，闵成林1703，果枝；同地。海拔1530米，1985年5月12日，闵成林1888，花枝（模式标本存西北林学院树木标本室）；同地，1985年5月10日，闵成林1890，花枝；同地，1985年5月10日，闵成林1891，花枝。

茎秆坚韧、拉力强，为优良的绳索材料农民常用作牛套绳。

本新种的发现，有重要意义：改变了迄今认为该科、属是我国特有的单种属、科的认识；基于新种叶、花的特征，对该科、属的形态记载要作重要修订；对该科、属及邻近分类群的起源亲缘系统的研究，有重要意义。此等问题，作者将另文研讨。

— • • • —




图. 单叶血藤 *Sargentodoxa simplicifolia* S. Z. Qu et C. L. Min

1. 花枝 (flowering branch); 2. 茎的横切面 (transvers section of stem); 3. 成长叶 (mature leaf); 4. 萼片 (sepal); 5. 花瓣 (petal); 6-8. 雄花 (male flower); 6. 去掉部分花萼 (take away a part of sepal); 7. 雄蕊正面观 (the front view of a stamen); 8. 雄蕊侧面观 (the side view of a stamen); 9-12. 两性花 (hermaphrodite); 9. 去掉部分花萼 (take away a part of sepal); 10. 雌雄蕊群 (androecium and gynoecium); 11. 雌蕊 (pistil); 12. 雄蕊 (stamen); 13. 聚合果 (aggregate fruit); 14. 果实 (fruit); 15. 种子 (seed).